

# ALAVIS™ 5

## Kĺbový veterinárny prípravok pre psy a mačky

### Obsah účinných látok v 1 tablete:

Glukozamín sulfát	500 mg
Chondroitín sulfát	200 mg
MSM - Metylsglykózylmetán	200 mg
Kolagén typu II.	60 mg
Kyselina hyalurónová	18 mg



ALAVIS™ 5 vyživuje kĺbové chrupavky, podporuje viskoelastické vlastnosti kĺbovej tekutiny, pomáha pri pohybových problémoch psov a mačiek. ALAVIS™ 5 obsahuje kombináciu látky MSM a chondroprotektívnych látok – glukozamín sulfátu, chondroitín sulfátu, kyseliny hyalurónovej a kolagénu.

Glukozamín sulfát – stimuluje bunky chrupavky (chondrocyt) a syntéze proteoglykánov a je základným substrátom pre ich vznik. Proteoglykány sú základné stavebné zložky chrupavky. Chondroitín sulfát – viaže veľké

množstvo vody, čím hydratuje chrupavku, podporuje vznik proteoglykánov a redukuje kolagénolytickú aktivitu. Má mierny protizápalový účinok. Látka MSM – je organicky viazaná síra, ktorá pôsobí na spevnenie väzov a šíach, potlačenie zápalu a bolesti a na regeneráciu a relaxáciu svalov. Kyselina hyalurónová – hlavná súčasť kĺbovej synoviaľnej tekutiny. Čím vyššia je koncentrácia kyseliny, tým lepšie sú viskoelastické vlastnosti chrupavky. Je dôležitá pre agregáciu proteoglykánových monomérov. Kolagén II. typu je hlavnou bielkovinou kĺbovej elastické chrupavky, zabezpečuje pevnosť a pružnosť spojivových tkániv.

### Odporučame podávať:

- psom a mačkám s kĺbovými ťažkosťami (zvlášť staršie zvieratá či pri poúraزوčích stavoch)
- športovým a pracovným psom všetkých vekových kategórií, napr.: služobné psy, dostihové psy, saňové psy, psy trénujúce agility
- šeňatámat veľkých a obrích plemien počas vývoja

### Dávkovanie:

Hmotnosť psa, mačky	Iniciačná dávka (prvých 14 dní užívania) denne	Udržiavacia dávka (pokračovacia) denne
1 - 5 kg	1/2 - 1 tableta	1/4 - 1/2 tablety
5 - 10 kg	1 - 2 tablety	1/2 - 1 tableta
10 - 15 kg	2 - 3 tablety	1 - 1,5 tablety
15 - 25 kg	3 - 4 tablety	1,5 - 2 tablety
25 - 45 kg	4 - 5 tabliet	2 - 2,5 tablety
45 a viac kg	5 - 6 tabliet	2,5 - 3 tablety



### Spôsob použitia:

Tablety sa podávajú denne podľa odporúčaného dávkowania priamo do papule alebo s kúskom potravy, event. rozdrvené do krmiva. Prípravok zvieratá obvykle prijímajú bez problémov.

### Dĺžka užívania:

Prípravok podávajte optimálne tri mesiace, potom urobte 1 – 3 mesiace pauzu a prípravok opäť nasadte.

### Upozornenie:

Prípravok je možné podávať s krmivami obsahujúcimi chondroprotektívne látky. Pozitívny účinok sa tak zvýši. Prípravok neobsahuje cukor.